



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION



**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE/
NASIONALE SENIOR
SERTIFIKAAT**

GRADE/GRAAD 11

NOVEMBER 2023

**PHYSICAL SCIENCES P1/
FISIESE WETENSKAPPE V1
MARKING GUIDELINE/NASIENRIGLYN**

MARKS/PUNTE: 150

This marking guideline consists of 14 pages./
Hierdie nasienriglyn bestaan uit 14 bladsye.

**QUESTION/VRAAG 1: MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS/
MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE**

- | | | |
|------|------|-----|
| 1.1 | C ✓✓ | (2) |
| 1.2 | B ✓✓ | (2) |
| 1.3 | B ✓✓ | (2) |
| 1.4 | A ✓✓ | (2) |
| 1.5 | A ✓✓ | (2) |
| 1.6 | D ✓✓ | (2) |
| 1.7 | D ✓✓ | (2) |
| 1.8 | C ✓✓ | (2) |
| 1.9 | B ✓✓ | (2) |
| 1.10 | B ✓✓ | (2) |
- [20]**

QUESTION/VRAAG 2

- 2.1 A single vector having the same effect as two or more vectors combined. ✓✓
OR

The vector sum of two or more vectors.

'n Enkele vektor wat dieselfde effek het as twee of meer vektore saam.

OF

Die vektor som van twee of meer vektore.


(2)

- 2.2 x-axis / x-as

F_1	F_2	F_3
$F_x = 500 \cos 60^\circ \checkmark$	$F_x = 600 \cos 50^\circ \checkmark$	$F_x = 450 \text{ N } \checkmark \text{ left /}$
$F_x = 500 \sin 30^\circ$	$F_x = 600 \sin 40^\circ$	<i>links</i>
= 250 N right	= 385,3726 N right/regs	
$F_x = 250 + 385,3726 - 450 = 185,37 \text{ N } \checkmark \text{ right / regs}$		

y-axis / y-as

F_1	F_2	F_3
$F_y = 500 \sin 60^\circ \checkmark$	$F_y = 600 \sin 50^\circ \checkmark$	$F_x = 0$
$F_y = 500 \cos 30^\circ$	$F_y = 600 \cos 40^\circ$	
= 433,0127 N	= 459,62667 N	
up/opwaarts	down/afwaarts	
$F_y = 433,0127 - 459,62667 = 26,61 \text{ N } \checkmark \text{ down / afwaarts}$		



$$\begin{aligned} F_{\text{net}}^2 &= F_x^2 + F_y^2 \\ F_{\text{net}}^2 &= 185,3726^2 + 26,61397^2 \\ F_{\text{net}} &= 187,27 \text{ N } \checkmark \end{aligned} \quad \begin{aligned} \theta &= \tan^{-1}\left(\frac{185,3726}{26,61397}\right) \\ \theta &= 81,83^\circ \checkmark \end{aligned}$$

(9)

- 2.3 The resultant force is not equal to zero. ✓✓
Die resulterende krag is nie gelyk aan nul nie.

(2)
[13]



QUESTION 3/VRAAG 3

- 3.1 The coefficient is a ratio of two forces. ✓

Die koëffisiënt is die verhouding tussen twee kragte.

(1)

- 3.2



(4)

Mark awarded for arrow and label. / *Punt toegeken vir pyltjie en benoeming.*

Do not penalise for length of arrows since drawing is not drawn to scale,

Moenie vir die lengte van die pyltjie penaliseer nie aangesien die tekening nie volgens skaal is nie.

Any other additional force(s) / *Enige ander addisionele krag(te)* Max/Maks. $\frac{3}{4}$

If force(s) do not make contact with body./ *Indien krag(te) nie met die voorwerp kontak maak nie.* Max./Maks. $\frac{3}{4}$

- 3.3 A body will remain in its state of rest or motion at constant velocity ✓ unless a non-zero resultant/net force acts on it. ✓

'n Liggaam sal in sy toestand van rus of beweging teen konstante snelheid volhard, tensy 'n nie-nul resulterende/netto krag daarop inwerk.

(2)

- 3.4.1 $F_{net} = ma$

$$F \cos \theta - f_k = ma$$

$$F \cos \theta - \mu_k N = ma$$

$$F \cos 35^\circ \checkmark - 0,2[(20 \times 9,8) - F \sin 35^\circ \checkmark] \checkmark = 0 \checkmark$$

$$F = 41,98 \text{ N } \checkmark \quad (41,5 - 42,1)$$

(6)

- 3.4.2 $N = F_g - F \sin \theta$

$$N = 20 \times 9,8 - 41,98 \sin 35^\circ \checkmark$$

$$N = 171,92 \text{ N } \checkmark \quad (171,89)$$

(2)

- 3.4.3 $f_k = \mu_k N$

$$f_k = 0,2 \times 171,92 \checkmark$$

$$f_k = 34,38 \text{ N } \checkmark \quad (34,3 - 34,6)$$

(2)

- 3.5 HIGHER/HOËR ✓✓

(2)

[19]

QUESTION 4/VRAAG 4

- 4.1 When a resultant/net force acts on an object, the object will accelerate in the direction of the force. The acceleration is directly proportional to the force ✓ and inversely proportional to the mass ✓ of the object.

OR

The acceleration is directly proportional to the resultant/net force ✓ and inversely proportional to the mass ✓ of the object.


Wanneer 'n resulterende / netto krag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die krag. Die versnelling is direk eweredig aan die krag en omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp.

OF

Die versnelling is direk eweredig aan die krag en omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp.

(2)

4.2



(4)

Mark awarded for arrow and label. / Punt toegeken vir pyltjie en benoeming

Do not penalise for length of arrows since drawing is not drawn to scale,

Moenie vir die lengte van die pyltjie penaliseer nie aangesien die tekening nie volgens skaal is nie.

Any other additional force(s) / Enige ander addisionele krag(te) Max./Maks. $\frac{3}{4}$

If force(s) do not make contact with body./ Indien krag(te) nie met die voorwerp kontak maak nie. Max./Maks. $\frac{3}{4}$

4.3 $F_{\text{net}} = ma$
 $F_{\text{net}} = F - T - f$
 $F_{\text{net}} = T - F_{g\parallel} - f$

Any one / Enige een ✓

4-kg mass / massa

$$[T - (4 \times 9,8 \sin 25^\circ)] \checkmark - 4 = 4a \checkmark$$

$$T - 15,6 = 4a \quad \dots (1)$$

8-kg mass/ massa

$$55 - T - 8 = 8a \checkmark$$

$$47 - T = 8a \quad \dots (2)$$

From (1) and (2) / Vanaf (1) en (2)

$$T = 26,07 \text{ N} \checkmark$$

(6)

- 4.4 Remains the same. ✓ Coefficient of kinetic friction depends only on the type of material. ✓

Bly dieselfde. Die koëffisiënt van kinetiese wrywing hang slegs van die tipe materiaal af.

(2)

[14]

QUESTION 5/VRAAG 5

5.1



(2)

$$\begin{aligned} 5.2 \quad & F_{\text{net}} = ma \\ & T - F_g = ma \\ & T - 780 \times 9,8 = 0 \checkmark \\ & T = 7644 \text{ N} \checkmark \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Any one / Enige een } \checkmark \\ \text{ } \end{array} \right\}$$

(3)

$$\begin{aligned} 5.3.1 \quad & \text{Increase/Neem toe } \checkmark \\ & F_{\text{nett}} \neq 0. \checkmark \checkmark \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} 5.3.2 \quad & F_{\text{net}} = ma \\ & T - F_g = ma \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Any one / Enige een } \checkmark \\ \text{ } \end{array} \right\}$$

$$\underline{7800 - 780 \times 9,8} \checkmark = 780a \checkmark$$

$$\therefore a = 0,2 \text{ m.s}^{-1} \checkmark$$

(4)
[11]

QUESTION 6

- 6.1 Equal to. ✓ When object **A** exerts a force on object **B**, object **B** simultaneously exerts an oppositely directed force ✓ of equal magnitude on object **A**. ✓

*Gelyk aan. Wanneer voorwerp **A** 'n krag op voorwerp **B** uitoefen sal voorwerp **B** gelyktydig 'n krag van gelyke grootte en in die teenoorgestelde rigting ✓ op voorwerp **A** uitoefen. ✓*

(3)

- 6.2 Each body in the universe attracts every other body with a force that is directly proportional to the product of their masses, ✓ and inversely proportional to the square of the distance between their centres. ✓

Elke liggaam in die heelal trek elke ander liggaam aan met 'n krag direk eweredig aan die produk van hul massas ✓ en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hul middelpunte. ✓

(2)

6.3 $F = \frac{GM_1M_2}{d^2}$ ✓

$$F = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,98 \times 10^6 \times 1\,000}{(6,38 \times 10^6 + 1,2 \times 10^6)^2} \checkmark$$

$$F = 6,94 \times 10^{-15} \text{ N} \checkmark \quad (5)$$

6.4 $g = \frac{GM}{d^2}$ ✓

$$g = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 7,35 \times 10^{22}}{(1,737 \times 10^6)^2} \checkmark$$

$$g = 1,62 \text{ m.s}^{-2} \checkmark \quad (4)$$

[13]

QUESTION 7/VRAAG 7

7.1.1 $Q_{\text{netto}} = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{3} \checkmark$

$$Q_{\text{netto}} = \frac{5 \times 10^{-9} + (-8 \times 10^{-9}) + 0}{2} \checkmark$$

$$Q_{\text{netto}} = -1 \times 10^{-9} \text{ C} \checkmark \quad (3)$$

7.1.2 $n = \frac{Q}{q_e} \checkmark$

$$n = \frac{-1 \times 10^{-9}}{-1,6 \times 10^{-19}} \checkmark$$

$$n = 6,25 \times 10^9 \text{ electrons / elektrone} \checkmark \quad (3)$$

7.2



Marking criteria / Nasienkriteria

Each line, arrow and label /
Elke lyn, pyltjie en benoeming

(2)

7.3 $F = \frac{kQ_1Q_2}{r^2} \checkmark$

$$F_A = \frac{(9 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-9})}{0,15^2} \checkmark = 400 \text{ N right/regs}$$

$$F_C = \frac{(9 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-9})}{0,2^2} \checkmark = 225 \text{ N left/links}$$

$$F_{\text{net}} = F_A - F_C$$

$$F_{\text{net}} = 400 - 225 \checkmark$$

$$F_{\text{net}} = 175 \text{ N right / regs} \checkmark$$

(5)
[13]

QUESTION 8/VRAAG 8

- 8.1 Same sign. ✓ For the net electric field at point **P** to be zero, the two electric fields must be in opposite directions. ✓

*Dieselde teken. Vir die netto elektriese veld by punt **P** om nul te wees, moet die twee elektriese velder in teenoorgestelde rigtings wees.*

(2)



Marking criteria / Nasienkriteria	
✓	Shape / Vorm
✓	Direction of field / Rigitng van veld
✓	Lines touching charge and not crossing <i>Lyne raak aan die lading en nie kruis nie</i>

(3)

- 8.3 Electrostatic force experienced per unit positive charge placed at that point. ✓✓

Elektrostasiese krag ervaar wat per eenheids positiewe-lading wat by daardie punt geplaas is, ondervind word.

(2)

8.4 $E = \frac{kQ}{r^2}$ ✓

$$E_1 = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}}{(r)^2} \checkmark = \frac{36\ 000}{r^2} \text{ N}$$

$$E_2 = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{(0,2)^2} \checkmark = \frac{27\ 000}{0,04} = 675\ 000$$

$$E_{\text{net}} = E_1 - E_2$$

$$\therefore E_1 = E_2$$

$$\therefore \frac{36\ 000}{r^2} = \frac{27\ 000}{0,04} = 675\ 000$$

$$\therefore r = 0,23 \text{ m} \checkmark$$

(5)
[12]

QUESTION 9/VRAAG 9

- 9.1 The magnitude of the induced emf across the ends of a conductor ✓ is directly proportional to the rate of change in the magnetic flux linkage the conductor. ✓

Die grootte van die geïnduseerde emk oor 'n geleier ✓ is direk eweredig aan die tempo van verandering van die magnetiese vloed in die geleier. ✓ (2)

- 9.2 Pull the solenoid out of the magnetic field faster.
Increase the number of turns on the coil.
Increase the area of the coil.
Use a stronger magnetic field.

} (Any two)
✓✓

*Trek die solonoïed vinniger uit die magnetiese veld
Vermeerder die aantal windings in die spoel.
Vergoot die oppervlakte van die spoel.
Gebruik 'n sterker magneetveld.*

} (Enige twee)

(2)

9.3.1 $\Phi = BA \cos\theta$ ✓
 $\Phi = 0,4 \times 0,06 \cos 0$ ✓
 $\Phi = 0,024 \text{ Wb}$ ✓

(3)

9.3.2 $\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ ✓
 $\varepsilon = -350 \frac{0 - 0,024}{0,3}$ ✓
 $\varepsilon = 28 \text{ V}$ ✓

(3)
[10]

QUESTION 10/VRAAG 10

- 10.1 Temperature or Resistance / Potential difference ✓
Temperatuur of Weerstand / Potensiaalverskil
(Any one / Enige een) (1)

- 10.2 Ohm's Law / *Ohm se wet* ✓ (1)

Marking criteria / Nasienkriteria	
✓	Axes labelled with units / Asse benoem met eenhede
✓	Two points plotted correctly / Twee punte korrek geplot
✓	All points plotted correctly / Alle punte korrek geplot
✓	Straight line from origin / Reguitlyn deur die oorsprong

(4)

- 10.4 The current passing through the conductor ✓ is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, ✓ if the temperature remains constant. ✓

Die stroom wat deur die geleier vloei ✓ is direk eweredig aan die potensiaalverskil oor die punte van die geleier, ✓ indien die temperatuur konstant bly. ✓

(3)

OPTION 1/OPSIE 1

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \checkmark$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \checkmark$$

$$R_p = 4 \Omega \checkmark$$

$$R = R_p + R_s = 4 + 3 = 7 \Omega \checkmark$$

OPTION 2/OPSIE 2

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \checkmark$$

$$R_p = \frac{6 \times 12}{6 + 12} \checkmark$$

$$R_p = 4 \Omega \checkmark$$

(4)

$$R = \frac{V}{I} \checkmark$$

$$7 = \frac{14}{I} \checkmark$$

$$I = 2 A \checkmark$$

(3)

$$R_p = \frac{V_p}{I}$$

$$4 = \frac{V_p}{2} \checkmark$$

$$V_p = 8 V$$

$$I_2 = \frac{8}{12} \checkmark$$

$$I_2 = 0,67 A$$

$$W = I^2 R \Delta t \checkmark$$

$$W = 0,67^2 \times 8 \times 120$$

$$W = 430,94 J \checkmark$$

$$I_1 = \frac{6}{18} \times 2 \checkmark$$

$$I_2 = 0,67 A$$

$$V_8 = 0,67 \times 8 \checkmark$$

$$V_8 = 5,36 V$$

$$V_s = IR$$

$$V_s = 2 \times 3$$

$$V_s = 6 V$$

$$V_p = 14 - 6 \checkmark = 8 V$$

$$I_2 = \frac{8}{12} \checkmark$$

$$I_2 = 0,67 A$$

$$W = \frac{V^2}{R} \Delta t \checkmark$$

$$W = \frac{5,36^2}{8} \times 120 \checkmark$$

$$W = 430,94 J \checkmark$$

$$W = VI \Delta t \checkmark$$

$$W = 5,36 \times 0,67 \times 120 \checkmark$$

$$W = 430,94 J \checkmark$$

(5)

10.6 **OPTION/OPSIE 1**

$$W = VI\Delta t \checkmark$$

$$W = 220 \times 16 \checkmark \times 0,5 \checkmark$$

$$W = 1,76 \text{ kWh}$$

$$\text{Cost / Koste} = 1,76 \times 2,56$$

$$\Delta t = R4,51 \checkmark$$

OPTION/OPSIE 2

$$R = \frac{V}{I} = \frac{220}{16} = 13,75 \Omega$$

(1)

$$W = \frac{V^2 \Delta t}{R} \checkmark$$

$$= \frac{220^2 \times 0,5 \checkmark}{13,75 \checkmark}$$

$$\text{Cost / Koste} = 1,76 \times 2,56$$

$$= R4,51 \checkmark$$

OR/OF

(2)

$$W = I^2 R \Delta t \checkmark$$

$$= 16^2 \times 13,75 \times 0,5 \checkmark \checkmark$$

$$= 1,76 \text{ kWh} \checkmark$$

$$\text{Cost / Koste} = 1,76 \times 2,56$$

$$= R4,51 \checkmark$$

(4)
[25]**TOTAL/TOTAAL:** 150

QUESTION/VRAAG 10.3